

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari berbagai jurnal dengan menghitung rata-rata didapatkan adanya keterkaitan tertinggi terjadinya kanker ovarium oleh:

1. Usia menopause terlambat memiliki rata-rata OR 2.613 [95%CI 0.93-8.03] yang berarti memiliki risiko terjadinya kanker ovarium sebesar 2,6 kali lebih berisiko daripada usia menopause dini.
2. Usia menarche dini memiliki rata-rata OR 2.22 [95%CI 1.0298-5.3838] yang berarti memiliki risiko terjadinya kanker ovarium 2,2 kali lebih berisiko daripada menarche terlambat.
3. Penggunaan Kontrasepsi dengan rata-rata OR 1.282 [95%CI 0.567-3.306] yang berarti memiliki 1,28 kali berisiko terkena kanker ovarium.
4. Paritas memiliki rata-rata OR <1 yaitu 0.394 [95%CI 0.313-0.543] yang berarti hanya 0,3 kali risiko terkena kanker ovarium sehingga justru memiliki efek protektif terhadap terjadinya kanker ovarium.

B. Saran

1. Kepada masyarakat : dapat dijadikan pengetahuan sebagai bentuk preventif terjadinya kanker ovarium dengan mengetahui faktor risiko yang berpengaruh.
2. Kepada penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih spesifik mengenai mekanisme terjadinya kanker ovarium dengan faktor risiko non hormonal.