

III. MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian untuk memenuhi tugas akhir dilakukan pada:

Waktu Penelitian : Januari – Desember 2022

Tempat Penelitian : Desa Wedusan Kecamatan Tiris Kabupaten
Probolinggo

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kejadian prolapsus uteri yang diperoleh dari hasil observasi dan praktek dilapangan.

3.3 Teknik Pengumpulan

Data Dalam penelitian ini, pengumpulan data – data yang diperoleh berdasarkan metode – metode seperti:

1. Metode Studi Pustaka

Penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, jurnal hasil penelitian yang bertujuan untuk menyusun dasar teori yang digunakan untuk mendukung proses penulisan penelitian.

2. Metode Observasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data, digunakan untuk mengetahui data sebenarnya yang ada dilapangan dan sebagai data penunjang untuk terlaksananya proses penelitian.

3.4 Alat yang digunakan

Alat yang digunakan untuk penanganan kasus prolapsus uteri yaitu : 1) needle, 2) needle holder, 3) jarum tajam, 4) spuit, 5) sarung tangan latek, 6) ember, 7) karung.

3.5 Bahan yang digunakan

Bahan bahan yang digunakan meliputi penanganan kasus prolapsus uteri berupa obat-obatan yaitu:Roxine, B-Complek, Injektamin, Sulpidon, Colibact,Campuran air dan povidoneiodine, serta Obat semprot gusanex sprej.

3.6 Prosedur Kegiatan

Adapun penelitian ini memiliki tahapan prosedur sebagai berikut :

1. Petugas mencuci tangan terlebih dahulu,
2. Uterus diirigasi dengan air yang dicampur povidoneiodine, dengan takara 1 liter air diberi povidoneiodine sebanyak 50 ml begitu juga kelipatannya, disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat bersihnya uteri,
3. uterus direposisi secara manual, setelah kembali ke posisi normal dimasukkan obat colibact bolus 1 pil melalui vulva,
4. Dilakukan pembersihan disekitar vulva,
5. Kemudian dilakukan proses penjahitan,
6. Setelah dilakukan proses penjahitan kemudian sapi di injeksi dengan obat Roxine, B-Complek, Injektamin dan Sulpidon pada bagin bahu sapi kanan kiri, di bokong kanan kiri masing memiliki dosis 10 ml,
7. Setelah 10-15 hari jahitan di buka dan disemprot dengan obat semprot Gusanex spray.