

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penanganan kasus prolapsus vagina terhadap 4 (empat) ekor sapi di desa Dukuh Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan pada Januari – Maret tahun 2023. Telah dilakukan prosedur meliputi pembersihan, tindakan reposisi, penjahitan, serta terapi pemberian obat antibiotik dan multivitamin secara intramuscular.

5.2 Saran

Untuk mencegah terjadinya prolapsus vagina maka disarankan agar induk bunting dibiarkan bergerak, tidak menempatkan induk bunting pada kandang yang mempunyai kemiringan lebih dari 45°. Faktor pemicu terjadinya prolapsus vagina adalah faktor hormon, dengan pergantian hormonal pada trimester terakhir masa kebuntingan, menjadi pemicu prolapsus vagina khususnya kenaikan hormon estrogen serta produksi hormon relaxin, yang menimbulkan relaksasi dari ligamen panggul. Kenaikan tekanan intra abdominal akibat pembesaran uterus karena kebuntingan. Tekanan intra abdominal karena lemak, distensi rumen, fetus yang besar, terdapatnya fetus lebih dari satu, keadaan lingkungan alam yang berbukit-bukit menjadi pemicu pula terbentuknya prolapsus vagina. Dalam penanganan prolapsus vagina perhatikan tingkat kebersihan dari vagina yang berada diluar tubuh. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya infeksi yang membahayakan.