


BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual



Keterangan :

————— : Diteliti

----- : Tidak diteliti

—————▶ : Memengaruhi

Gambar III. 1 Kerangka Konsep MPASI dengan kejadian diare pada anak usia 4—24 bulan di Puskesmas Dukuh Kupang Surabaya

Menurut Gibney (2013), faktor yang memengaruhi pemberian MPASI dini meliputi; faktor pengetahuan dan faktor lingkungan. Adapun faktor lain, seperti faktor kesehatan ibu (ibu dengan riwayat positif HIV dan *infectious disease* lainnya) dan ASI yang tidak adekuat. Menurut Wijoyo (2013), faktor penyebab diare meliputi ; faktor infeksi (virus, bakteri, basil, jamur dan parasit), faktor malabsorpsi, dan faktor makanan yang dikonsumsi.

Pencegahan diare dapat dilakukan dengan cara ; akses air minum yang bersih, sanitasi yang baik, mencuci tangan, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI sesuai umur, *personal hygiene* yang baik, edukasi mengenai jalan penyakit infeksi, vaksinasi rotavirus, dan buang air besar di jamban. Pemberian ASI adalah salah satu tindakan dari pencegahan diare. Namun, peneliti hanya membatasi penelitiannya terkait dengan pemberian MPASI dengan kejadian diare.

B. Hipotesis Penelitian

Ada hubungan pemberian MPASI dengan kejadian diare pada anak usia 4—24 bulan di kerja Puskesmas Dukuh Kupang Surabaya