

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian perlakuan parasetamol dosis 250mg/kg BB sebagai induktor gagal ginjal akut yang diberikan selama 10 hari secara peroral tidak memiliki pengaruh yang signifikan ($P>0.05$) terhadap kadar glukosa dan bilirubin pada urin.
2. Pemberian perlakuan parasetamol dosis 400mg/kg BB sebagai induktor gagal ginjal akut yang diberikan selama 10 hari secara peroral tidak memiliki pengaruh yang signifikan ($P>0.05$) terhadap kadar glukosa dan bilirubin pada urin.

5.2 Saran

Disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan uji pengaruh pemberian parasetamol sebagai induktor gagal ginjal akut dengan menggunakan parameter yang berbeda ataupun dengan bahan uji sampel yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya parameter yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.