

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan bahwa pemberian multivitamin pada kasus hipofungsi ovarium akibat malnutrisi di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, menunjukkan hasil efektivitas yang bervariasi. Tingkat keberhasilan dari suplementasi multivitamin untuk mengembalikan estrus pada sapi dengan rata-rata 60,99 %. Ini merupakan persentase dari jumlah sapi yang mengalami estrus kembali dibandingkan dengan total jumlah sapi yang menjadi subjek pengamatan. Sedangkan yang 39,1% tidak mengalami estrus ada faktor lain, diantaranya defisiensi hormon dan stres lingkungan. Pemberian multivitamin cenderung bervariasi antara individu sapi potong. Beberapa sapi mungkin menunjukkan respons yang lebih baik terhadap pemberian multivitamin daripada yang lain. Pemberian multivitamin pada sapi yang mengalami hipofungsi ovarium akibat malnutrisi dengan multivitamin vitamin A, D, dan E dan B untuk menunjang kesehatan ternak dan menjaga kesehatan reproduksi sapi, selain itu juga diperlukan peningkatan pada nutrisi ternak, manajemen pakan, manajemen pemeliharaan dan faktor lingkungan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dari pemberian multivitamin pada kasus sapi potong yang mengalami hipofungsi ovarium akibat malnutrisi di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, dapat disarankan diberikan terapi sesuai serakaiaan perlakuan dan terapi yang meliputi perbaikan pakan dengan

memberikan kosentrat, pemberian obat cacing, pemberian premiks dan bisa
dibuatkan silase dan fermentasi.