

PENGARUH PEMBERIAN KRIM EKSTRAK BAWANG MERAH (*Allium cepa*)

by Asih Rahayu

Submission date: 20-Jan-2022 10:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 1744523242

File name: 7._PENGARUH_PEMBERIAN_KRIM_EKSTRAK_BAWANG_MERAH_Allium.pdf (351.69K)

Word count: 2002

Character count: 11994

PENGARUH PEMBERIAN KRIM EKSTRAK BAWANG MERAH (*Allium cepa*) TERHADAP PROSES PENYEMBUHAN LUKA BAKAR PADATIKUS PUTIH (*Rattus norvegicus*)

Asih Rahayu¹, Adhitya Yoppy Ro¹³ndra¹, Kurnia Latif¹, Nurul Hidayah^{1*}

¹ Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*Email: nurulhidayah78@uwks.ac.id

Abstract

*This study aimed to determine the influence of onion extract cream (*Allium cepa*) for burning burns in white rats (*Rattus norvegicus*). The research was experimental with a concentration of 45%, 50%, and 55% onion Cream Extract (*Allium cepa*). The Data can then be processed using the Kruskal Wallis test. From the statistical test results, each level of Bakart wound showed noticeable difference. The $P < 0.05$ is thus distinct from P1, P2, and P3. At the level of fluid burns Sig 0.000, because ($P < 0.05$) There were noticeable difference in the treatment of PO with P1, P2, and P3. The conclusion of this study of the introduction of onion extract Cream (*Allium cepa*.) can be used for wound healing in white rats (*Rattus norvegicus*).*

Keywords: shallots (*Allium cepa* L.), luka, white rats (*Rattus norvegicus*)

PENDAHULUAN

Luka bakar adalah kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti air panas, api, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Penanganan dan pengobatan luka bakar pada hewan harus segera dilakukan. Karena luka bakar dapat menyebabkan kematian dan cacat pada hewan (Barus dan Lestari, 2018). Proses penyembuhan luka terdiri dari tahap fase inflamasi, fibroblastik, dan pematangan. Tubuh kembali berusaha menormalkan kembali semua dengan proses penyembuhan secara alami. Dengan menggunakan zat tambahan yang diharapkan dapat membantu menghindari gangguan proses penyembuhan luka seperti infeksi, hematoma, dan benda asing (Yunanda dan Rinanda, 2016).

Penggunaan obat tradisional di Indonesia menyimpan banyak potensi sumber daya alam hayati sebagai sumber bahan pangan dan obat-obatan. Bahan yang mudah didapat dan biaya yang murah menjadikan pengobatan tradisional yang sering digunakan. Pengobatan tradisional di nilai lebih aman apabila digunakan sesuai dengan ketentuan dosis, waktu penggunaan, dan ketentuan cara penggunaan supaya tidak terjadi penyalahgunaan (Rubiah dan Djufri, 2017). Bawang merah (*Allium cepa* L.) merupakan salah satu tanaman

hortikultura yang populer dalam dunia kuliner, sebagai bumbu masakan (*flavor*), sayuran (acar dan salad) dan produk olahan bawang goreng (Sari, dkk. 2017).

Bawang merah merupakan tanaman yang memiliki umbi, padakulit dan dagingnya berwarna ungu kemerahan. Bawang merah dapat hidup di dataran tinggi. Serinya aktif yang dimiliki bawang merah yaitu Allisin dan Alliin, Flavonoid, Alilpropil disulfide, Fitosterol, Flavonol, Pektin, Saponin, Tripropanal sulfoksida, dan senyawa acetogenin. Senyawa flavonoid yang bersifat anti inflamasi serta anti mikroba sangat berguna untuk membantu proses penyembuhan radang akibat luka memar, luka bakar, atau radang pada organ tubuh dalam (Nilan, dkk. 2019). Bentuk sediaan topikal yang dapat dengan mudah digunakan untuk pengobatan pada luka bakar adalah salah satunya dengan pemberian sediaan krim. Penggunaan dalam bentuk sediaan krim lebih efektif. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya dengan sediaan topikal ekstrak bawang dapat membantu proses penyembuhan luka sayat pada mencit. Dengan konsentrasi 5%, 30%, dan 55% ekstrak bawang merah (*Allium Cepa* L.) yang mempunyai nilai bermakna terhadap proses penyembuhan luka.

MATERI DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental, penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan teknik pengambilan sampel secara random/acak dengan menggunakan 5 perlakuan dan 5 kali pengulangan untuk masing-masing perlakuan. Sampel yang digunakan adalah tikus wistar jantan, umur 2-3 bulan, berat badan 200-300 gram.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel kendali.

1. Variabel bebas pada penelitian ini berupa perlakuan dalam pemberian krim ekstrak bawang merah terhadap tikus putih dengan pemberian yang berbeda-beda sesuai kelompok perlakuan yaitu krim ekstrak bawang merah dengan konsentrasi 45%, 50%, dan 55%.
2. Variabel tergantung pada penelitian ini berupa kebengkaan luka, cairan pada luka.
3. Variabel kendali pada penelitian ini berupa diameter luka bakar pada tikus putih (*Rattus norvegicus*).

Pembuatan ekstraksi bawang merah dilakukan dengan metode maserasi. Sebanyak 1 kg umbi bawang merah dikeringkan selama 7 hari, kemudian dikupas dan dipotong kasar. Umbi bawang merah yang dipotong dimasukkan ke dalam tabung dan kemudian dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 500 ml.

Setiap 24 jam ekstrak tersebut disaring dan diganti pelarutnya dengan 300 ml etanol 96% yang baru. Proses maserasi ini dilakukan 3 kali sampai diperkirakan semua senyawa yang terkandung didalamnya terekstrak habis. Hasil maserasi disaring dengan menggunakan corong Buchner dan vakum. Ekstrak yang didapat kemudian diuapkan dan dipekatkan dengan evaporator tekanan rendah pada suhu


50°C sampai diperoleh ekstrak. Ekstrak kental yang diperoleh merupakan ekstrak dengan konsentrasi 100 %. Selanjutnya ekstrak tersebut diencerkan menggunakan aquades menjadi ekstrak dengan konsentrasi 45%, 50%, dan 55%.

HASIL

Tabel 1. Rata-Rata dan Simpangan

Perlakuan	Mean $\pm$ SD
PO -	18,50 $\pm$ 0,000 ^a
PO +	16,00 $\pm$ 0,447 ^a
P1	13,50 $\pm$ 0,548 ^a
P2	8,50 $\pm$ 0,447 ^{ab}
P3	8,50 $\pm$ 0,447 ^{ab}

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata ($P < 0,05$).




Gambar 1. Grafik Rata – rata Nilai Tingkat Kebengkaan Luka Bakar

Rata-rata nilai tingkat kebengkaan luka bakar tertinggi terdapat pada perlakuan (P0-) yang tidak di beri pengobatan yaitu 18,50 ±Superskip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata ($P < 0,05$).

Tabel 2. Rata-Rata dan Simpangan Baku Nilai Tingkat Cairan Luka Bakar

Perlakuan	Mean ± SD
PO -	23,00 ± 0,000 ^a
PO +	10,55 ± 0,000 ^b
P1	10,55 ± 0,000 ^b

Nilai rata-rata cairan pada luka bakar diamati 14 hari adalah 23,00 ± 0,000^a (P0-), dan rata-rata pada perlakuan yang di berikan krim ekstrak bawang merah (P0+), (P2) dan (P3) memiliki rata-rata yang sama yaitu Nilai signifikan pada tabel kruskal wallis adalah 0,000 ($p < 0,05$) maka terdapat perbedaan nyata terhadap perlakuan. Dari uji lanjutan dengan uji mann-whitney dapat dilihat bahwa kontrol (-) memiliki notasi a, kontrol positif notasi b, krim 45% notasi b, krim 50% notasi b, pasta krim 55% notasi b.



Gambar 2. Grafik Rata – rata Nilai Tingkat Cairan Luka Bakar

Rata-rata nilai tingkat cairan luka bakar tertinggi terdapat pada perlakuan (P0-) yang tidak diberi pengobatan yaitu 23,00 ±0,000^a, dan rata-rata terendah pada perlakuan yang di berikan krim ekstrak bawang merah (P0+), (P2) dan (P3) 10,55 ± 0,000^b. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan kruskal wallis, kesembuhan luka pada tikus (*Rattus norvegicus*) menunjukkan bahwa

terdapat perubahan yang nyata. Dengan menggunakan uji lanjutan mann-whitney dapat dilihat perbandingan bahwa kontrol (-) dan perlakuan P1, perlakuan P2, perlakuan P3 terdapat perbedaan nyata.

PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan kebengkaan luka secara makroskopis dan analisis data menggunakan Uji Kruskal Wallis didapatkan hasil bahwa pada kontrol (-) mendapatkan hasil kurang baik dari semua perlakuan, dikarenakan tanpa pemberian krim ekstrak angka kesembuhan cukup lama dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya karena tidak adanya obat yang bekerja untuk mengurangi rasa sakit apabila terjadi peradangan dan pendarahan (Haryani, dkk 2012). kesembuhan baru terlihat pada hari ke-14 luka sudah sembuh, dikarenakan pada kontrol (-) ini tidak diberi perlakuan pengobatan.

Kebengkaan pada perlakuan kontrol (+) yang diberi pengobatan betadin dengan rata-rata (16,00) pada hari ke-13 terlihat luka tidak megalami kebengkaan dibanding kontrol (-) yang tidak diberikan pengobatan. karena povidone iodine 10% mempunyai kandungan yang mampu membunuh semua mikroorganisme penyebab infeksi nosokomial baik bakteri gram positif maupun negatif, termasuk mikroorganisme yang resisten terhadap spora, antibiotik, dan jamur (Rahmawati, 2014).

Pada perlakuan P-1 yang diberi pengobatan krim ekstrak bawang merah 45% dengan rata rata (13,50) hari ke-13 terlihat luka tidak megalami kebengkaan. P-2 yang diberi pengobatan krim ekstrak bawang merah 50% pada hari ke-12 terlihat luka tidak megalami kebengkaan. P-3 yang diberi pengobatan krim ekstrak bawang merah 55% pada hari ke-10 terlihat luka tidak megalami kebengkaan. P2 dan P3 menunjukkan dengan rata-rata sama (8,50) perbedaanya yang paling signifikan, hasil dari Skrining ekstrak bawang merah memiliki kandungan allin dengan kadar 2,36%, flavonoid 6,11%, dan saponin 4,05%. Bisa disimpulkan bahwa di angka 50% sudah cukup optimal Penyembuhan kebengkakan luka yang diberikan perlakuan ekstrak krim bawang merah (*Allium cepa L.*) lebih cepat karena mempunyai kandungan anti inflamasi yaitu aliin, flafanoid, dan saponin (Misna dan Diana, 2016).

Dari hasil pengamatan cairan luka secara makroskopis dan analisis data menggunakan Uji Kruskal Wallis didapatkan hasil bahwa pada kontrol (-) mendapatkan hasil kurang baik dari semua perlakuan, karena kesembuhan baru terlihat pada hari ke-10 luka sudah sembuh, dikarenakan pada kontrol (-) ini tidak diberi perlakuan pengobatan masih cukup banyak cairan dikarenakan Fase inflamasi awal adalah darah akan memasuki jaringan yang terluka dan tercemarnya darah pada kolagen akan menyebabkan terjadinya pengaktifan faktor hemagen dan degranulasi trombosit hal ini yang menyebabkan cairan pada luka (Mufimah, dkk, 2019).

Cairan pada perlakuan kontrol (+) yang diberi pengobatan betadin pada hari ke-9 terlihat luka tidak terdapat adanya cairan dibanding kontrol (-) yang tidak diberikan pengobatan, Pada perlakuan (P1) yang diberi pengobatan krim ekstrak bawang merah 45% hari ke-9 terlihat luka tidak terdapat adanya cairan. Krim ekstrak Bawang merah (*Allium cepa* L.) dan betadine (*Povidone-iodine*) bisa untuk proses kesembuhan karena bisa memproses re-epitalisasi infiltrasi sel-sel radang pada jaringan luka yang memblokir cairan dan epidermis (Pongsipulung, dkk. 2012). (P2) yang diberi pengobatan krim ekstrak bawang merah 50% pada hari ke-9 terlihat luka tidak terdapat adanya cairan. (P3) yang diberi pengobatan krim ekstrak bawang merah 55% pada hari ke-8 terlihat luka tidak adanya cairan. Semakin banyak kandungan tannin maka cairan pada luka semakin cepat terhambat karena tannin mempunyai peran untuk menetralkan protein inflamasi, menghambat h₁₈ sekresi cairan pada mukosa dan juga berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba yang memengaruhi penyembuhan luka juga mempercepat epitelisasi (Kurnianto, dkk. 2017).

KESIMPULAN

24 Pemberian Krim ekstrak bawang merah (*Allium cepa* L.) dapat menyembuhkan luka bakar pada tikus putih (*Rattus Norvegicus*). Kesembuhan luka bakar yang paling efektif dengan konsentrasi 55%. Berdasarkan penelitian ini tentang luka bakar menggunakan krim ekstrak bawang merah (*Allium Cepa* L.) perlu adanya penelitian lebih

lanjut dengan konsentrasi yang berbeda dan dilihat juga secara mikroskopis terhadap proses penyembuhan luka.

REFERENSI

- Barus. B. R. , I. Lestari. 2018. Pengaruh Ekstrak Umbi Bawang Merah dan Bawang Putih Terhadap Luka Bakar Pada Kelinci. Jurnal Farmasimed. 1(1): 1-5.
- Haryani, A., 40ffi, G., Ibnu, D. B., Ayi, S., 2012. Uji Efektivitas Daun Pepaya (*Carica Papaya*) Untuk Pengobatan Infeksi Bakteri *Aeromonashydrophila* Pada Ikan Mas Koki (*Carassius Auratus*). Jurnal Perikanan Dan Kelautan. 3 (3); 218.
- Jasmadi, R. N, Salim, A, Harris, 2016. Efektifitas Salep Getah Jarak Pagar 9%(*Jatropha curcas* linn) Dan Gentamisin 0,1% Terhadap Percepatan Penyembuhan Luka Bakar Derajat II Pada Kulit Mencit (*mus m₂₃ulus*). Jurnal Medika Veterinaria. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Syah Kuala. Banda Aceh. 10(2): 2503-1600
- Kurnianto, S., Kusnanto., Padoli., 2017. Penyembuhan Luka Bakar Pada Tikus Putih Menggunakan Ekstrak Daun Pegagan (*Centela Asiatica*) 25% dan Ekstrak Daun Petai Cina (*Leucaena Leucocephala*) 30%. Jurnal Ilmiah Kesehatan.10(2) : 250-255.
- Kurniawan, P, A, E. Hidayat, N. Wijoyo, H, S. 2018. Implementasi Metode Iterative Dichotomizer Tree Untuk Diagnosis Penyakit Pada Tanaman Bawang Merah. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi. Fakultas Ilmu Komputer. Universitas Brawijaya. 2(10) : 3391-3396. 2
- Misna. K, Diana, 2016. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Bawang Merah (*Allium cepa* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*. Journal of Pharmacy. 2(2) : 138-144. 8
- Mufimah., Hidayat, R, U., Budhiharto, I, 2018. Efektivitas Gel Ekstrak Bawang Putih Terhadap Proses Penyembuhan Luka Fase Inflamasi. Jurnal Vokasi Kesehatan. 4(2): 109-114.

- Rahmawati, I., 2014. Perbedaan Efek Perawatan Luka Menggunakan Gerasan Daun Petai Cina (*Leucaena glauca*) Dan Povidone Iodine 10% Dalam Mempercepat Penyembuhan Luka Bersih Pada Marmut (*Carvia Porceolus*). Jurnal Wiyata. 1(2): 227-234.
- 16 Rubiah. Djufri. Muhibbuddin. 2017. Etnobotani Tumbuhan Obat Luka Pada Masyarakat. Jurnal Edubio Tropika. Universitas Syiah Kuala. 5(2): 54-106.
- Sari, V. Miftahudin, Sobir. 2017. Keragaman Genetik Bawang Merah (*Allium cepa L.*) Berdasarkan Marka Morfologi dan ISSR. Jurnal Agrom Indonesia. Institut Pertanian Bogor. 45(2): 176-182.
- Yunanda, V. T. Rinanda. 2016. Aktivitas Penyembuhan Luka Sediaan Topikal Ekstrak Bawang Merah (*Allium cepa*) Terhadap Luka Sayat Kulit Mencit. Jurnal Veteriner. 17(4): 606-614

PENGARUH PEMBERIAN KRIM EKSTRAK BAWANG MERAH (Allium cepa)

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Didik Tulus Subekti, Mira Fatmawati, Arie Khoiriyah, Arum Pramesthi et al.

"Seroprevalence of Seven Reproductive Diseases in Beef and Dairy Cows from Three Provinces in Indonesia", Veterinary Medicine International, 2021

Publication

1%

2

D Chusniasih, T Tutik. "Identification phytochemical compound of ethanol and acetone extract of Cocoa Pods (Theobroma cacao L.) using GC-MS", Journal of Physics: Conference Series, 2021

Publication

1%

3

Fina Ulviani, Yusriadi Yusriadi, Khildah Khaerati. "PENGARUH GEL EKSTRAK DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum Ruiz & Pav) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA BAKAR PADA KELINCI (Oryctolagus cuniculus)", Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal), 2016

Publication

1%

4	Nurul Fitri Ramdani, Christi Mambo. "UJI EFEK DAUN KEMANGI (<i>Ocimum basilicum</i> L.) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA INSISI PADA KELINCI (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)", Jurnal e-Biomedik, 2014 Publication	1 %
5	ejurnal.stkip-pessel.ac.id Internet Source	1 %
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
7	simakip.uhamka.ac.id Internet Source	1 %
8	Qotrunnada Salsabila, Hendri Busman. "Aktivitas Anti-Inflamasi Bawang Hitam (<i>Allium sativum</i> L.)", Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 2021 Publication	1 %
9	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	1 %
10	biosaintropis.unisma.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %

13	Submitted to Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Student Paper	1 %
14	eprints.unram.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
16	conference.unsri.ac.id Internet Source	1 %
17	www.scilit.net Internet Source	1 %
18	Eva F. Palumpun, Anak A.G.P. Wiraguna, Wimpie Pangkahila. "Pemberian ekstrak daun sirih (Piper betle) secara topikal meningkatkan ketebalan epidermis, jumlah fibroblas, dan jumlah kolagen dalam proses penyembuhan luka pada tikus jantan galur Wistar (Rattus norvegicus)", Jurnal e-Biomedik, 2017 Publication	1 %
19	Pramono Putro Utomo. "MAKING OF NATURAL PRESERVATIVE FROM JACKFRUIT WOOD EXTRACTS WITH MALTODEKSTRIN TO GROW THE NIRA DAMAGE MICROBA", JURNAL BORNEO AKCAYA, 2016 Publication	1 %
20	repository.unib.ac.id Internet Source	

1 %

21

Dwi Sandri, Ema Lestari. "DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP ROTI MANIS YANG DISUBSTITUSI MODIFIED TALIPUK FLOUR (MOTAF) DAN PATI TEMULAWAK", Jurnal Agroindustri, 2020

Publication

<1 %

22

Repatri A Bawotong, Edwin De Queljoe, Deby A Mpila. "UJI EFEKTIVITAS SALEP EKSTRAK DAUN JARAK PAGAR (*Jatropha curcas* L.) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA SAYAT PADA TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (*Rattus norvegicus*)", PHARMACON, 2020

Publication

<1 %

23

onesearch.id

Internet Source

<1 %

24

e-perpus.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

25

freedownloadsskripsi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

Yulie Oktavia, Yartiwi Yartiwi, Ahmad Damiri. "KERAGAAN PERTUMBUHAN DAN TINGKAT KELAYAKAN USAHA TANI TIGA VARIETAS BAWANG MERAH : STUDI KASUS DI KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN

<1 %

REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU", Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia, 2019

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off