


BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Hubungan Pemberian ASI dan Susu Formula Dengan Kejadian Diare

B. Penjelasan Kerangka Konsep

Diare pada bayi terjadi akibat dari adanya faktor *host*, faktor ibu (pengetahuan mengenai cara menyiapkan ASI dan susu formula yang baik), faktor agen dan faktor lingkungan (pada bayi). Pada kandungan ASI memiliki antibodi, sedangkan pada susu formula tidak terdapat antibodi, di mana pada antibodi dapat membantu sistem imun pada bayi sehingga tidak mudah terkena penyakit, salah satunya adalah diare. Pada penelitian ini peneliti meneliti tentang faktor pengetahuan ibu mengenai penyiapan saat memberi ASI dan Susu Formula, serta faktor kebersihan lingkungan ketika bayi mulai aktif bergerak. Dalam penelitian ini peneliti memilih ASI dan susu formula sebagai variable bebas (*independent*) dan diare sebagai variable terikat (*dependent*).

C. Hipotesis

H₀: Tidak terdapat hubungan antara pemberian ASI dan susu formula dengan kejadian diare pada bayi usia 0 – 12 bulan di Puskesmas Batuputih.

H₁: Terdapat hubungan antara pemberian ASI dan susu formula dengan kejadian diare pada bayi usia 0 – 12 bulan di Puskesmas Batuputih

