

Karakterisasi dan Formulasi Tepung Komposit Kimpul- Kacang Tunggak Untuk Pengembangan Biskuit Non Terigu

by Fungki Sri Rejeki

Submission date: 29-Mar-2021 10:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 1545047778

File name: KARAKTERISTIK_DAN_FORMULASI-PROSIDING_UTM.pdf (398.47K)

Word count: 4178

Character count: 23957

5

Karakterisasi dan Formulasi Tepung Komposit Kimpul-Kacang Tunggak Untuk Pengembangan Biskuit Non Terigu

Diana Puspitasari, Tri Rahayuningsih dan Fungki Sri Rejeki

27

Staf Pengajar Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknik,
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,
Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya
E-mail: diana.sidoarjo@gmail.com

ABSTRAK

Kimpul merupakan umbi-umbian yang mempunyai ⁴⁰ jang besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu sebagai usaha meningkatkan pemanfaatan potensi lokal, maka pada ⁴² nelitian ini dilakukan pembuatan tepung kimpul dengan perlakuan penghilangan rasa gatal, sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai bahan baku produk makanan olahan. Tujuan penelitian ini menetapkan proses penghilangan rasa gatal tepung kimpul dan menentukan karakteristik fisik dan kimia tepung kimpul. Penelitian ini terdiri dua tahap, tahap pertama penghilangan rasa gatal, dan optimasi pembuatan tepung kimpul yang terdiri atas 2 faktor yaitu blanching dan ⁹ndaman larutan garam, dan tahap kedua karakterisasi tepung kimpul dengan parameter pengamatan: kadar ²⁹ir, kadar protein, kadar Ca, kadar pati, kadar amilosa, kadar amilopektin, kadar serat kasar, serta organoleptik ²⁰a, dan tekstur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tepung kimpul terpilih adalah B2G4, dengan kadar air 12,35%; kadar protein 2,71%; kadar Ca 0,23%; kadar amilosa 22,03%; kadar amilopektin 34,27%; kadar pati 56,26%; kadar serat kasar 3,43%.

Kata kunci : kimpul, tepung kimpul, karakteristik

ABSTRACT

Purse are tubers that have a great chance to develop. Therefore, as an attempt to increase the utilization of local potential, so in this study conducted by making purse flour with itching removal treatment, which can be used further as raw material for processed food products. The purpose of this study is to establish the process of eliminating the itching of purse flour; and determine the physical and chemical characteristics of purse flour. This study consisted of two phases, the first phase is the removal of itching, and process optimization of purse flour consisting of two factors: blanching and salt solution soaking; and the second phase is characterization of purse flour with observation parameters (water content, protein, Ca, starch, amylose, amylopectin, crude fiber, as well as organoleptic test of color and texture. The results showed that the purse flour treatment chosen is B2G4, with content of water 12.35%; protein 2.71%; Ca 0.23%; amylose 22.03%; amylopectin 34.27%; starch 56.26%.

Keywords: purse, purse flour, characteristics

PENDAHULUAN

2

Kimpul sebagai salah satu jenis tanaman umbi-umbian mempunyai peluang yang besar ⁸uk dikembangkan karena memiliki berbagai manfaat dan dapat dibudidayakan dengan mudah. Kimpul dapat ¹²embangkan sebagai penghasil karbohidrat non beras yang cukup potensial (Azwar, 2010). Pengembangan produk ¹² diarahkan untuk menciptakan suatu produk baru yang bersifat praktis, dan mudah didapatkan. Salah satu jenis produk yang memenuhi kriteria tersebut adalah biskuit, yang bahan bakunya masih impor. Sedangkan Indonesia memiliki berbagai tanaman sumber karbohidrat yang berpotensi. Oleh karena itu sebagai usaha untuk meningkatkan pemanfaatan ³⁰nsi lokal yaitu kimpul serta menyediakan produk pangan yang praktis dan mudah didapat, maka pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan biskuit dengan bahan baku ³⁰tepung komposit kimpul-kacang tunggak.

Tujuan penelitian adalah menetapkan proses penghilangan rasa gatal tepung kimpul; menentukan karakteristik fisik dan kimia **5** pung kimpul; menentukan karakteristik fisik dan kimia tepung kacang tunggak; dan memperoleh **formulasi tepung komposit kimpul-kacang tunggak untuk produk** **biskuit** berdasarkan aproksimasi komponen kimia dan evaluasi sensori.

METODE

Penelitian dilakukan tiga tahap, yaitu proses penghilangan rasa gatal tepung kimpul; menentukan karakteristik **5** fisik dan kimia tepung kimpul; menentukan karakteristik fisik dan kimia tepung kacang tunggak; **dan formulasi tepung komposit kimpul-kacang tunggak untuk** produk **biskuit** berdasarkan aproksimasi komponen kimia dan evaluasi sensori.

Penghilangan rasa gatal Umbi Kimpul 16

Penghilangan rasa gatal pada kimpul dapat dilakukan dengan dua cara, **19** tu dengan perlakuan pemanasan (blanching) **dan** perendaman dalam larutan garam. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dengan 2 faktor yang diulang 3 kali.

Faktor I adalah blanching dengan 3 level, yaitu B1 Tanpa Blanching; B2 Blanching 70°C selama 10 menit; B3 Blanching 70°C selama 20 menit. Faktor II adalah perendaman dalam larutan garam dengan 4 level, yaitu G1 Tanpa perendaman; G2 Perendaman dengan konsentrasi garam 1%; G3 Perendaman dengan konsentrasi garam 3%; G4 Perendaman dengan konsentrasi garam 5 %.

Penentuan karakteristik fisik dan kimia tepung kimpul

Penelitian tahap ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik tepung kimpul dengan mengetahui sifat fisika dan kimia tepung kimpul terpilih pada tahap sebelumnya, sehingga dapat diketahui potensinya sebagai pengganti tepung terigu pada pembuatan biskuit.

Parameter pengujian dilakukan terhadap tepung kimpul dan tepung terigu, yang meliputi: uji kadar air dengan metode gravimetri (Sudarmadji *et al.*, 1984), uji kadar protein dengan metode micro kjehldal (AOAC, 1970 *dalam* Sudarmadji, 1984), uji kadar Ca dengan metode Spektrophotometer, uji kadar pati dengan metode hidrolisis asam (AOAC, 1970 *dalam* Sudarmadji, 1984), uji kadar amilosa dengan metode kurva standar, uji kadar serat kasar (Sudarmadji *et al.*, 1984), pengamatan warna dan tekstur secara visual.

Penentuan karakteristik fisik dan kimia tepung kacang tunggak

Pada tahapan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik tepung kacang tunggak guna mengetahui sifat fisika dan kimia tepung kacang tunggak, sehingga dapat diketahui potensinya sebagai penambah kandungan protein pada tepung komposit kimpul-kacang tunggak sebagai pengganti terigu pada pembuatan biskuit. Analisis kimia yang dilakukan sebagai berikut : uji kadar air dengan metode gravimetri (Sudarmadji *et al.*, 1984), uji kadar protein dengan metode micro kjehldal (AOAC, 1970 *dalam* Sudarmadji, 1984), uji kadar serat kasar (Sudarmadji *et al.*, 1984).

5

Formulasi tepung komposit kimpul-kacang tunggak untuk produk biskuit

Tepung kimpul dan tepung kacang tunggak terpilih dicampurkan dalam berbagai persentase. Persentase tepung yang digunakan diformulasikan dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Apriani, dkk (2011). Tepung kimpul yang digunakan berkisar antara 50-90% yaitu 50%, 60%, 70%, 80%, dan 90%. Sedangkan tepung kacang tunggak yang digunakan berkisar antara 10-50% yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Susunan formula tepung komposit kimpul-kacang tunggak dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Pemilihan satu jenis tepung komposit terbaik dilakukan dengan aproksimasi kandungan kimia dan uji sensoris. Uji sensoris dilakukan dengan menggunakan uji rangking hedonik terhadap parameter sensoris produk. Uji ini dilakukan untuk mendapatkan satu formula yang paling disukai oleh konsumen berdasarkan parameter uji yang digunakan. Parameter yang diuji adalah warna, dan tekstur. Uji sensoris dengan rangking hedonic menggunakan 30 orang panelis. Panelis akan merangking formula tepung komposit mulai yang paling tidak disukai sampai paling disukai.

Angka terendah menunjukkan formula yang paling tidak disukai, sedangkan angka tertinggi menunjukkan formula yang paling disukai.

Tabel 1. Susunan Formula Tepung Komposit Kimpul-Kacang Tunggak

Formula	Komposisi Tepung Komposit	
	Kimpul (%)	Kacang Tunggak (%)
1	50	50
2	60	40
3	70	30
4	80	20
5	90	10

Analisis Data

Pengolahan data uji organoleptik¹¹ yang merupakan data ordinal menggunakan Uji Friedman. Sedangkan pengolahan data kadar air, kadar protein, kadar Ca, kadar amilosa, kadar³² amilopektin, kadar serat kasar, dilakukan dengan analisis ragam, jika terdapat perbedaan dilakukan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf kepercayaan 95%.

Pemilihan Alternatif

Pemilihan alternatif dilakukan untuk menentukan perlakuan terbaik dalam proses pembuatan tepung kimpul. Dasar perhitungan untuk pemilihan alternatif adalah hasil kualitas produk untuk setiap parameter dan probabilitas dari masing-masing keadaan dasar. Konsep keputusan nilai yang diharapkan adalah untuk memilih suatu keputusan yang mempunyai *pay off* (keuntungan atau kegunaan) yang maksimum atau biaya (kerugian atau pengorbanan) yang minimum.

Tiap keadaan yang berbeda akan mempunyai probabilitas terjadi yang berbeda pula, sehingga dengan demikian akan dapat ditentukan perolehan maksimum dari setiap alternatif tindakan. Untuk produk tepung⁹ kimpul, parameter kualitas yang digunakan untuk pemilihan alternatif proses terbaik adalah kadar air, kadar karbohidrat, kadar protein, kadar Ca-oksalat, kadar abu, kadar lemak, kadar amilosa, kadar amilopektin, kadar serat kasar, suhu gelatinisasi, waktu gelatinisasi, dan daya serap tepung terhadap air dan minyak, serta uji sensoris terhadap warna, dan tekstur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Air Tepung Kimpul


Berdasarkan hasil analisis kimia, kadar air tepung kimpul berkisar antara 10,82% sampai 13,87%. Kondisi ini sudah memenuhi syarat kadar air yang aman untuk tepung yaitu <14% sehingga dapat mencegah pertumbuhan kapang (Winarno dan Jenie, 1974). Kadar air tepung kimpul sebagai salah satu jenis umbi memiliki kisaran yang hampir sama dengan kadar¹⁴ tepung umbi-umbian lain pada penelitian Richana dan Sunarti (2004). Menurut Fardiaz (1989) jumlah air dalam bahan akan mempengaruhi daya tahan bahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh mikroba maupun serangga. Pengeringan pada tepung dan pati bertujuan untuk mengurangi kadar air sampai batas tertentu sehingga pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim penyebab kerusakan pada tepung dan pati dapat dihambat. Batas kadar air mikroba masih dapat tumbuh ialah 14-15%.

Menurut Winata (2001), kadar air yang rendah pada tepung dengan perlakuan pramasak mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan bentuk granula pati karena pembengkakan yang *irreversibel*. Pembengkakan ini mempengaruhi sifat penyerapan maupun pengikatan granula terhadap air. Granula yang telah membengkak cenderung memiliki rongga antar sel yang lebih besar, sehingga selama pengeringan¹⁶ yang dikandung akan lebih mudah terlepas. Data hasil pengamatan kadar air tepung kimpul dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Data pada **Gambar 1** menunjukkan bahwa kadar air produk tepung kimpul cenderung meningkat pada perlakuan blansing dengan waktu yang lebih lama. Kadar air tertinggi pada perlakuan B3G3, sedangkan kadar air terendah pada perlakuan B2G1. Berdasarkan hasil penelitian

Kusumawati (2012) peningkatan **25** lar air ini diduga karena adanya proses blansing terlebih dahulu yang menyebabkan pati tedapat dalam bahan mengalami pembengkakan sehingga menyebabkan kemampuan menyerap air sangat besar.


Hasil analisis ragam untuk parameter kadar air menunjukkan bahwa terdapat interaksi antar perlaku**20** terhadap kadar air tepung kimpul. Faktor blanching dan perendaman dalam larutan garam berpengaruh nyata terhadap kadar air tepung kimpul.



Gambar 1. Data Hasil Pengamatan Kadar Air Tepung Kimpul (%)

Kadar Protein

Berdasarkan hasil analisis kimia, kadar protein tepung kimpul berkisar antara 2,36% sampai 3,00%. Kadar protein tepung kimpul ini masih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian Richana dan Sunarti (2004) menunjukkan bahwa tepung suweg, ubikelapa dan gembili mempunyai kadar protein yang tinggi yaitu berturut-turut 5,22 ; 6,66 ; dan 6,11%. Kadar protein pada tepung diharapkan tinggi, hal ini berkaitan dengan penggunaan tepung. Apabila tepung berkadar protein tinggi maka dalam aplikasinya tidak memerlukan bahan tambahan lagi. Kadar protein tepung kimpul yang masih rendah ini menyebabkan perlunya dilakukan pencampuran dengan bahan lain untuk meningkatkan kadar protein untuk menjadi tepung komposit, yaitu dengan pencampuran tepung kacang tunggak. Data hasil pengamatan kadar protein tepung kimpul dapat dilihat pada **Gambar 2**.




Gambar 2. Data Pengamatan Kadar Protein Tepung Kimpul (%)

Hasil analisis ragam untuk parameter kadar protein menunjukkan bahwa terdapat interaksi antar perlakuan terhadap kadar protein tepung kimpul. Kadar protein tertinggi pada perlakuan B2G1, sedangkan kadar protein terendah pada perlakuan B3G3. Faktor blansing dan perendaman dalam larutan garam berpengaruh nyata terhadap kadar protein tepung kimpul. Menurut Hanry and Steinberg (**6**84) dalam Hadiwyoto (1994) NaCl dapat berinteraksi dengan protein. Pada konsentrasi rendah menyebabkan protein mengalami *salting in* dan pada konsentrasi tinggi protein mengalami *salting out*. Pada proses *salting in* protein akan lebih mudah larut, sebaliknya pada peristiwa *salting out* protein akan mengendap dan tidak mudah larut. Kadar protein tepung kimpul

cenderung menurun pada perlakuan perendaman garam dengan konsentrasi yang meningkat. Hal ini disebabkan proses *salting out* sehingga daya larut protein berkurang. Akibatnya protein terpisah sebagai endapan (Winarno, 2002). Selain itu, garam mempunyai tekanan osmotik yang tinggi sehingga dapat menarik air dari bahan (Anonymous, 2003). Dengan menurunnya kadar air dalam tepung kimpul, maka kadar protein akan meningkat.

Kadar Calsium

Berdasarkan hasil analisis kimia, kadar Calsium (Ca) tepung kimpul berkisar antara 0,12% sampai 0,23%. Dibandingkan dengan kadar Ca pada umbi kimpul sebesar 1%, maka terjadi penurunan kadar Ca pada tepung kimpul. Penurunan kadar oksalat terjadi karena reaksi antara natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksalat (CaC_2O_4). Garam (NaCl) dilarutkan dalam air terurai menjadi ion-ion Na^+ dan Cl^- . Ion-ion tersebut bersifat seperti magnet. Ion Na^+ menarik ion-ion yang bermuatan negatif dan Ion Cl^- menarik ion-ion yang bermuatan positif. Sedangkan kalsium oksalat (CaC_2O_4) dalam air terurai menjadi ion-ion Ca^{2+} dan $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$. Na^+ mengikat ion $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ membentuk natrium oksalat ($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$). Ion Cl^- mengikat Ca^{2+} membentuk endapan putih kalsium diklorida (CaCl_2) yang mudah larut dalam air. Data hasil pengamatan kadar Ca tepung kimpul dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Data Hasil Pengamatan Kadar Ca Tepung Kimpul (%)


Hasil analisis ragam untuk parameter kadar Ca menunjukkan bahwa terdapat interaksi antar perlakuan terhadap kadar Ca tepung kimpul. Faktor blanching dan perendaman dalam larutan garam berpengaruh nyata terhadap kadar Ca tepung kimpul.

33


Kadar Pati, Amilosa, dan Amilopektin

Berasarkan hasil analisis kimia, kadar pati tepung kimpul berkisar antara 51,23% sampai 62,88%. Kadar pati merupakan salah satu kriteria mutu untuk tepung, baik sebagai bahan pangan maupun non-pangan (Richana dan Sunarti, 2004). Kadar amilosa tepung kimpul berkisar antara 20,95% sampai 24,61%. Sedangkan kadar amilopektin tepung kimpul berkisar antara 27,93% sampai 40,04%.


Hasil analisis ragam untuk parameter kadar pati, amilosa, dan amilopektin menunjukkan bahwa terdapat interaksi antar perlakuan terhadap kadar pati tepung kimpul. Faktor blanching dan perendaman dalam larutan garam berpengaruh nyata terhadap kadar pati, amilosa, dan amilopektin tepung kimpul. Amilosa dan amilopektin berpengaruh pada sifat tepung yang dihasilkan. Sifat fungsional pati pada tepung juga dipengaruhi oleh varietas, kondisi alam, dan tempat tanaman tersebut berasal (Srichuwong *et al.*, 2005; Riley *et al.*, 2006). Kecenderungan terjadinya retrogradasi menyebabkan kristalisasi yang disertai dengan kecilnya molekul amilosa dan panjangnya rantai amilopektin (Peroni *et al.*, 2006). Amilopektin merupakan komponen yang berperan penting dalam proses gelatinisasi. Tingginya kadar amilosa dapat menurunkan kemampuan pati untuk m35 alami gelatinisasi (Tester dan Morisson, 1990). Data hasil pengamatan kadar pati tepung kimpul dapat dilihat pada Gambar 4, 5, dan 6.



Gambar 4. Data Hasil Pengamatan Kadar Pati Tepung Kimpul (%)



Gambar 5. Data Hasil Pengamatan Kadar Amilosa Tepung Kimpul (%)




Gambar 6. Data Hasil Pengamatan Kadar Amilopektin Tepung Kimpul (%)

Kadar Serat Kasar

Berdasarkan hasil analisis kimia, kadar serat kasar tepung kimpul berkisar antara 2,91% sampai 4,17%. Data hasil pengamatan kadar serat kasar tepung kimpul dapat dilihat pada Gambar 7.

Hasil analisis ragam untuk parameter kadar serat kasar menunjukkan bahwa terdapat interaksi antar perlakuan terhadap kadar serat k₄₅ tepung kimpul. Faktor blanching dan perendaman dalam larutan garam berpengaruh nyata terhadap kadar serat kasar tepung kimpul.



Gambar 7. Data Hasil Pengamatan Kadar Serat Kasar Tepung Kimpul (%)

Organoleptik Warna

Berdasarkan hasil analisis frekuensi, persentase perolehan skor untuk parameter warna tepung kimpul ditunjukkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Persentase Perolehan Skor Uji Organoleptik Parameter Warna (%)

Skor	Perlakuan											
	B1G1	B1G2	B1G3	B1G4	B2G1	B2G2	B2G3	B2G4	B3G1	B3G2	B3G3	B3G4
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
2	16,7	10,0	0,0	3,3	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	43,3	0,0	0,0
3	38,3	60,0	60,0	16,7	3,3	36,7	36,7	16,7	40,0	33,3	20,0	33,3
4	50,0	30,0	36,7	33,3	66,7	50,0	46,7	40,0	53,3	0,0	50,0	40,0
5	0,0	0,0	3,3	26,7	30,0	13,3	10,0	36,7	6,7	3,3	30,0	26,7

Hasil prosentase perolehan skor parameter warna menunjukkan bahwa prosentase tertinggi untuk skor 5 (menyukai) dicapai oleh perlakuan B2G4 sebesar 36,7%, sedangkan prosentase tertinggi untuk skor 4 (agak menyukai) dicapai oleh perlakuan B2G1 sebesar 66,7%. Hal ini menunjukkan perlakuan blanching pada proses pembuatan tepung kimpul dapat meningkatkan tingkat kesukaan panelis terhadap warna tepung kimpul yang dihasilkan, dan perlakuan endaman dalam larutan garam dengan konsentrasi yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan tingkat kesukaan panelis terhadap warna tepung kimpul yang dihasilkan. Namun batasan berapa konsentrasi larutan garam untuk perendaman yang dapat diterima oleh panelis untuk parameter warna tepung kimpul belum terukur lebih terinci, dan perlu penelitian lebih lanjut. Analisis data lebih lanjut dengan uji Friedman menunjukkan perolehan skor parameter warna menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata antar perlakuan.

Organoleptik Tekstur

Berdasarkan hasil analisis frekuensi, persentase perolehan skor untuk parameter tekstur tepung kimpul ditunjukkan pada **Tabel 3**.

Hasil prosentase perolehan skor parameter tekstur menunjukkan bahwa prosentase tertinggi total untuk skor 5 (menyukai) dan 4 (agak menyukai) dicapai B2G1 sebesar 46,7% (skor 5) dan 30,0% (skor 4). Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan blanching selama 10 menit pada suhu 70°C memiliki skor tingkat penerimaan panelis yang lebih tinggi untuk parameter tekstur. Analisis data lebih lanjut dengan uji Friedman menunjukkan perolehan skor parameter tekstur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata antar perlakuan.

Tabel 3. Persentase Perolehan Skor Uji Organoleptik Parameter Tekstur (%)

Skor	Perlakuan											
	B1G1	B1G2	B1G3	B1G4	B2G1	B2G2	B2G3	B2G4	B3G1	B3G2	B3G3	B3G4
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0
2	0,0	10,0	0,0	26,7	0,0	50,0	20,0	3,3	16,7	33,3	23,3	16,7
3	53,3	66,7	56,7	56,7	53,3	43,3	56,7	43,3	53,3	26,7	50,0	40,0
4	46,7	23,3	30,0	16,7	46,7	0,0	23,3	53,3	26,7	26,7	26,7	43,0
5	0,0	0,0	13,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0

Karakterisasi Tepung Kacang Tunggak

Penelitian tahap ke-3 ¹¹ lakukan karakterisasi tepung kacang tunggak dengan analisis kimia pada parameter kadar protein, kadar lemak, ⁸ kadar air, kadar abu, kadar karbohidrat, dan serat kasar. Hasil analisis kimia tepung kacang tunggak dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Hasil Analisis Kimia Tepung Kacang Tunggak

Parameter	Hasil
Air (%)	11,5
Protein (%)	8,51
Serat Kasar (%)	3,21

Pemilihan Alternatif

Probabilitas atau peluang merupakan tingkat keyakinan seseorang terhadap suatu kejadian yang tidak pasti. Analisis probabilitas dilakukan untuk menentukan peluang dari masing-masing keadaan dasar. Keadaan dasar untuk kualitas meliputi warna, tekstur, kadar air, kadar protein, Ca, dan kadar pati, amilosa, amilopektin. Nilai probabilitas untuk tiap keadaan dasar tercantum pada **Tabel 5** dan ditunjukkan.

Tabel 5. Nilai Probabilitas Tiap Keadaan Dasar Tepung Kimpul

Keadaan dasar	Probabilitas (%)
Warna	15
Tekstur	15
Kadar air	15
Protein	20
Ca	20
Pati, amilosa, amilopektin	20

Pemilihan alternatif dilakukan dengan cara menghitung nilai harapan yang diperoleh masing-masing perlakuan. Berdasarkan hasil pemilihan alternatif, nilai harapan tertinggi diperoleh perlakuan B2G4 dengan total nilai harapan 7,74, sehingga perlakuan B2G4 ini terpilih untuk tahap lebih lanjut menjadi tepung komposit.

Formulasi Tepung Komposit Kimpul-Kacang Tunggak

¹⁵ Pemilihan formula tepung komposit dilakukan berdasarkan aproksimasi komponen kimia dan uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan untuk melihat preferensi panelis terhadap tepung komposit yang dihasilkan.

Berdasarkan uji organoleptik yang dilakukan formula dengan skor tertinggi diperoleh formula 5 dengan skor rangking rata-rata 3,63 untuk parameter warna dan 3,30 untuk parameter

tekstur. Formula ini terdiri dari campuran 50% tepung kimpul dan 50% tepung kacang tunggak. Hasil uji peringkat yang diperoleh dapat dilihat pada **Tabel 6**.

Hasil uji peringkat formula tepung komposit secara organoleptik menunjukkan bahwa semakin banyak prosentase tepung kacang tunggak yang digunakan, terlihat kecenderungan panelis semakin tidak menyukai formula tersebut. Sebaliknya semakin banyak tepung kimpul yang digunakan dan semakin sedikit tepung kacang tunggak yang digunakan, panelis semakin menyukai formula tersebut. Hal ini disebabkan tekstur yang lebih keras pada formula jika semakin banyak kacang tunggak yang digunakan, serta warna yang semakin coklat jika semakin banyak prosentase kacang tunggak digunakan pada formula, meskipun semakin banyak kacang tunggak yang digunakan akan meningkatkan kandungan protein tepung komposit yang dihasilkan.

Tabel 6. Hasil Uji Peringkat Formula Tepung Komposit

Formula	Formula tepung (%)		Parameter uji		Skor rata-rata
	Tepung kimpul	Tepung kc. Tunggak	Warna	Tekstur	
1	50	50	2,87	2,70	2,79
2	60	40	2,93	2,77	2,85
3	70	30	3,00	2,90	2,95
4	80	20	3,20	3,27	3,24
5	90	10	3,62	3,30	3,46

38

Data hasil uji statistik lebih lanjut dengan menggunakan uji Friedman menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata antar formula tepung komposit pada parameter warna dan tekstur. Oleh karena itu pemilihan formula selanjutnya dilakukan berdasarkan parameter yang memiliki nilai probabilitas tertinggi yaitu kadar protein seperti dapat dilihat pada **Gambar 2**.

Kadar protein tertinggi dimiliki oleh formula 1 diperkirakan sekitar 5,61%, kadar air 11,93%, dan kadar serat kasar 3,32%. Kadar protein tepung komposit formula 1 masih rendah namun sudah ada peningkatan dibandingkan kadar protein tepung kimpul sendiri. Sedangkan kadar air tepung komposit formula 1 masih <14%. Kondisi ini sudah memenuhi syarat kadar air yang aman untuk tepung yaitu <14% sehingga dapat mencegah pertumbuhan kapang (Winarno dan Jenie, 1974).

KESIMPULAN

- Alternatif perlakuan terpilih tepung kimpul pada penelitian berdasarkan nilai harapan adalah B2G4 dengan nilai harapan 7,74. Pada perlakuan B2G4 parameter warna memperoleh total skor 5 (menyukai) dan skor 4 (agak menyukai) 76,7%; parameter tekstur memperoleh total skor 4 (agak menyukai) 53,3%; kadar air 12,35%; kadar protein 2,71%; kadar Ca 0,23%; kadar amilosa 22,03%; kadar amilopektin 34,27%; kadar pati 56,26%; dan kadar serat kasar 3,43%.
- Tepung komposit yang terpilih berdasarkan uji organoleptik dan aproksimasi komponen kimia adalah formula 1 dengan perbandingan tepung kimpul 50% dan tepung kacang tunggak 50%. Diperkirakan komposisi kimia tepung komposit formula 1 adalah kadar protein 5,61%, kadar air 11,93%, dan kadar serat kasar 3,32%.

18

DAFTAR PUSTAKA

- AOAC. 1996. *Official of Analysis of the Association of Official Analytical Chemistry*. AOAC Inc., Washington, DC 8
- Azwar, D.; dan R. Erwanti. Pembuatan Sirup Glukosa Dari Kimpul (*Xanthosoma violaceum Schott*) Dengan Hidrolisa Enzimatis. <http://www.eprints.undip.ac.id>. Tanggal akses 11 Mei 2010
- Colison, R. 1968. Swelling and Gelation of Starch dalam Radley, J. A. (ed) *Starch and Its Derivatives*. Chapman and Hall. Ltd. London.

- Dhesalit²⁶. 2003. *Manfaat Umbi Talas (Bentul, Keladi).* <http://www.suarapembaruan.com/News/2003/08/06/index.html>. Tanggal akses 27 Desember 2008.
- Fardiaz, S. 1989. *Mikrobiologi Pangan I.* PAU Pangan Gizi. IPB. Bogor.
- Glicksman, M. 1969. *Gum Technology in Food Industry.* Academic Press. Yogyakarta.
- Husodo, S. Y; dan Mu⁴⁶adi T. 2004. *Alternatif Solusi Permasalahan dalam Ketahanan Pangan.* Makalah pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII; Jakarta, 17-19 Mei 2004
- Richana, N. Dan Sunarti, T. C. 2004. Karakterisasi Sifat Fisikokimia Tepung Umbi dan Tepung Pati dari Umbi Ganyong, Suweg, Ubikelapa, dan Gembili. *Jurnal Pascapanen* 1 (1) 2004 : 29³⁷
- Sebito, S. 1988. *Analisis Farmasi.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Widowati, S. 2001. *Tepung Ganyong : Kegunaan dan Proses Pembuatan.* Berita Puslitbangtan 19 : 1-2.
- Widowati, S. 2003. *Prospek Tepung Suku untuk Berbagai Produk Makanan Olahan dalam Upaya Menunjang Diversifikasi Pangan.* Makalah Pribadi Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702) Program¹³ Pasca Sarjana/S3 Institut Pertanian Bogor.
- Widowati, S. 2009. *Tepung Aneka Umbi: Sebuah Solusi Ketahanan Pangan.* Sinar Tani Edisi 6-12 Mei 2009, No. 3302 Tahun XXXIX.
- Winarno, F. G. Dan Jenie, S. L. 1974. *Dasar Pengawetan, Sanitasi, dan Peracunan.* Departemen Teknologi Has³ Pertanian. Fatemeta. IPB. Bogor.
- Winarno, F. G. 1995. *Kimia Pangan dan Gizi.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Winata, A. Y. 2001. *Karakterisasi Tepung Sukun (*Artocarpus altilis*) Pramasak Hasil Pengeringan Drum Serta Aplikasinya untuk Substitusi Tepung Terigu pada Pembuatan Roti Manis.* Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. IPB. Bogor.

Karakterisasi dan Formulasi Tepung Komposit Kimpul-Kacang Tunggak Untuk Pengembangan Biskuit Non Terigu

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Submitted to Universitas Brawijaya
Student Paper | 5% |
| 2 | spentibafamily.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 3 | Ifmalinda Ifmalinda, Andasuryani Andasuryani, Husein Lubis. "Kajian Karakteristik Fisikokimia dan Organoleptik Tepung Salak Sidimpuan (Salacca sumatrana)", Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering), 2019
Publication | 1 % |
| 4 | ejournal.umm.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | sinta3.ristekdikti.go.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | Submitted to Universitas Bung Hatta
Student Paper | 1 % |
| 7 | etheses.uin-malang.ac.id | |

8

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1 %

9

Nursafa Nursafa, Erna Rusliana Muhamad Saleh, Mustamin A. Masuku. "The Differences Addition of Cristal Sugar Ratio on Red Peanut Jam in Local North Maluku", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2020

Publication

1 %

10

bengkulu.litbang.pertanian.go.id

Internet Source

<1 %

11

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

12

pasca.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

13

Riza Trihaditia, Tammy Tri Sundayati. "PENENTUAN FORMULASI TEPUNG DAN EKSTRAK INULIN UMBI DAHLIA TERHADAP MAKANAN FUNGSIONAL BUBUR INSTAN BERAS PANDANWANGI", Pro-STek, 2020

Publication

<1 %

14

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

15

edoc.site

Internet Source

<1 %

16

jurnal.unpad.ac.id

Internet Source

<1 %

17

ojs3.unpatti.ac.id

Internet Source

<1 %

18

journal.ipb.ac.id

Internet Source

<1 %

19

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

20

hmtip-unpas.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21

jrpj.unram.ac.id

Internet Source

<1 %

22

citation.itb.ac.id

Internet Source

<1 %

23

Magda Garbowski, Danielle B. Johnston,
Cynthia S. Brown. "Leaf and root traits, but not
relationships among traits, vary with ontogeny in
seedlings", Plant and Soil, 2021

Publication

<1 %

24

biogenesis.ejournal.unri.ac.id

Internet Source

<1 %

25

e-journals.unmul.ac.id

Internet Source

<1 %

26 [ilmuthp.wordpress.com](#)

Internet Source

<1 %

27 [irikaw.files.wordpress.com](#)

Internet Source

<1 %

28 [www.iris.unict.it](#)

Internet Source

<1 %

29 [repository.upnjatim.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

30 [issuu.com](#)

Internet Source

<1 %

31 [jurnal.umj.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

32 [repository.ump.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

33 Mariati Edam. "APLIKASI BAKTERI ASAM LAKTAT UNTUK MEMODIFIKASI TEPUNG SINGKONG SECARA FERMENTASI", Jurnal Penelitian Teknologi Industri, 2017

Publication

<1 %

34 Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

35 [eprints.unm.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

36

[lovedoc.org](#)

Internet Source

<1 %

37

[openjournal.masda.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

38

[repository.unj.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

39

[repository.usd.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

40

[repository.usu.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

41

[repositorij.unizg.hr](#)

Internet Source

<1 %

42

[rinestidwip.wordpress.com](#)

Internet Source

<1 %

43

Helen C.D. Tuhumury, La Ega, Nuram Keliobas.

"Pengaruh Substitusi Tepung Ubi Jalar Ungu

Terhadap Karakteristik Kue Kering",

AGRITEKNO, Jurnal Teknologi Pertanian, 2018

Publication

<1 %

44

[ojs.uho.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

45

[profood.unram.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

46

jurnalpangan.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On